TRAVAUX DU MOIS DE JUIN

AAVO
LES AMIS DES ABEILLES
DU VAL D'OISE

TRAVAUX DU MOIS DE JUIN

C’est un mois propice à plusieurs miellées*. Principalement celles de tilleul, de trèfle, de ronce et en fin de mois jusqu’en juillet: de châtaignier.

***La miellée** est la production saisonnière intense de nectar par les fleurs. (La miellée commence au printemps et atteint successivement diverses espèces florales jusqu'à la fin de l'été.)*

Pour les ruches en production il faut donc :

Contrôler le remplissage des hausses chaque semaine

- Dans de bonnes conditions une hausse peut être remplie en une dizaine de jours.
- Une ruche qui n'évolue pas comme les autres devra être visitée afin de découvrir la cause de son retard. (Essaimage en cours, maladie, orpheline)

Poser des hausses supplémentaires

- La première hausse a été posée en avril ou mai.
- Lorsqu'elle est au trois quart pleine et que la miellée semble se poursuivre on peut ajouter une seconde hausse.
- Si la première a été laissée à disposition complète de la colonie (sans grille à reine entre le corps et la hausse) il y a de fortes chances pour qu'elle contienne également du couvain. Il est alors judicieux d'insérer entre la 1ère et la 2ème hausse une grille à reine
- NOTA : Lorsque les miellées sont bien marquées on peut aussi récolter. Remettre ensuite après extraction la hausse ou les cadres prélevés.

Récolter le miel de printemps

- Avant tout, préparer la miellerie (ou tout local prévu pour l'extraction) et le matériel utile à cette dernière .
- **S'assurer de l'herméticité du local**

Opération de récolte

- Choisir une belle journée ensoleillée.
- Enlever les hausses le matin et faire l'extraction l'après-midi. Récolter les cadres operculés au 2/3 minimum
- Les cadres ne correspondant pas à ce critère ou contenant du couvain ne seront pas prélevés ou, s'ils le sont, seront mis de côté et redonnés groupés aux colonies

Opération de récolte, 1ère méthode

- Enfumer un peu la ruche par le trou de vol, l'ouvrir et décoller les cadres de la hausse.
- Les retirer un à un le plus rapidement possible en enfumant le moins possible (sinon le miel prendra un goût de fumée) et en les débarrassant des abeilles restantes par brossage ou en frappant les têtes de cadres avec le plat de la main au dessus ou au devant de la ruche.
- On place les rayons dans une hausse vide posée à côté sur un plateau ou un couvercle vide et couverte d'un linge légèrement humide ou d'un couvercle.
- Une fois remplie elle sera mise à l'abri du pillage.
- On retire alors la hausse vide de la ruche qui recevra à son tour les cadres d'une seconde hausse.

2ème méthode: L'utilisation du chasse abeilles

- Le chasse abeilles est fixé sur le trou de nourrissement du couvre cadre. Il permet le passage des abeilles dans un seul sens, de la hausse vers le corps de ruche.
- Les couvres-cadres ainsi équipés sont placés la veille du jour de la récolte, en fin de journée, entre le corps et la hausse. Chasse abeille côté corps.
  - Dans la nuit, les abeilles redescendent dans le corps de ruche et ne trouve plus le lendemain le chemin habituel pour se rendre dans les hausses.
- Les hausses, vides d'abeilles sont enlevées pratiquement sans fumée.
- **Nota : si la hausse contient du couvain, des abeilles y seront restées. Il faudra procéder comme en première méthode en n'enlevant que les cadres de miel.**

Chasse abeilles losange

Chasse abeilles rond

L’extraction

- Nettoyage des cadres de miel (enlèvement de la propolis et des excroissances de cire).
- Désoperculation des cadres l’aide d’un couteau adapté.
- Mise en place de ces derniers dans l’extracteur en essayant d’équilibrer les «masses» afin de limiter les vibrations.
- Pour ne pas briser les rayons chargés de miel, notamment les cires neuves qui sont plus fragiles, la vitesse de rotation doit être progressive.

MODELES D'EXTRACTEURS

tangentiel



radiaire

La mise en pot

- A la sortie de l'extracteur, le miel est filtré puis mis dans un maturateur (plastique ou cuve inox)
- Il y restera au minimum une semaine, délai nécessaire à une bonne épuration du miel qui se fait par décantation naturelle.
- Le miel est ensuite mis en pots lesquels seront stockés dans un local frais (14°).



Nettoyage des cadres

- Les cadres vidés de leur contenu seront remis en hausses. Celles-ci seront replacées «en direct» dans le cas d'une miellée à venir.
- S'il s'agit de la dernière récolte, les hausses seront mises au-dessus du couvre cadre, trou de nourrissement ouvert, pour léchage pendant 2 à 3 jours <u>pas plus</u>.

EN JUIN IL Y A ENCORE :

- La fièvre de l’essaimage

La fièvre de l’essaimage

- La population dans les ruches est très importante et composée essentiellement de butineuses.
- Il faut veiller « au manque de place » et ne pas hésiter à ajouter une hausse si nécessaire.

Le recueil d’essaims naturels

- ils seront installés en ruchette ou ruche sur cadres cirés.
- Mis en quarantaine dans un local frais pendant 48 heures (ruchette aérée et fermée).
- Ils seront nourris dès la mise en place définitive.
- puis traités contre le varroa.

Réunion de colonies

- Celles qui ne donnent pas satisfaction, seront orphelinées (suppression de la reine) et placées au-dessus des ruches receveuses après enfumage.

Suivi des essaims artificiels

- Vérifier
  - la présence d'une reine = Présence de ponte
  - l'état du couvain,
- Mise en ruche éventuelle selon l'essor de la colonie.